

緊急避妊剤

# レボノルゲストレル錠1.5mg「F」を 服用される患者様へ




## このお薬について

レボノルゲストレル錠1.5mg「F」は、  
避妊に失敗したとき、または避妊をしなかった性交後、  
緊急に避妊を行うときに用いるお薬です。

## このお薬の飲み方

**性交後72時間以内**に、1回1錠をできるだけ速やかに  
服用してください。  
服用する時刻や時間帯は特に定められていませんが、  
**なるべく早く服用**してください。



レボノルゲストレル錠は  
白色の錠剤で、  
1シートに1錠(1回分)が  
入っています。

次にあてはまる方は、  
**このお薬は使えません**

このお薬の成分に対して  
過去に過敏症を起こしたこと  
のある女性

肝臓に重篤な障害がある方

妊娠中の方

次にあてはまる方は、  
**医師に相談してください**

肝臓に障害のある方

心臓に疾患がある方

腎臓に疾患がある方

## 使用上の 注意

- このお薬は、妊娠を完全に阻止できるものではありません。
- このお薬は、避妊に失敗したとき、または避妊をしなかった性交後に緊急的に用いるもので、通常の経口避妊薬のように、計画的に妊娠を回避するものではありません。

## 服用後の 注意

- このお薬を飲んでから2時間以内に吐いてしまった場合は、すぐに医師に連絡してください。
- このお薬を飲んだ後も妊娠する可能性がありますので、適切な避妊の手段をとってください。
- このお薬を飲んだ後には、不正性器出血や妊娠初期の出血と通常の月経が区別できないことがありますので、医師の指導のもと再来院して診療を受けてください。
- このお薬の成分は乳汁中に移行するので、授乳中の方は、服用後24時間は授乳を避けてください。
- このお薬を飲んだ後に、月経のような出血（消退出血）があらわれることがあります。また、不正子宮出血や頭痛、吐き気、倦怠感、眠くなるなどの月経時にみられる症状が現れることがあります。症状が続く場合には、医師にご相談ください。
- このお薬を飲んだ後に、月経周期や出血の状況（日数や量）に一時的な変化がみられることがあります。

緊急避妊後に、計画的な避妊を行う方法として  
経口避妊薬を服用する方法があります。